



SEPTIGEL / SEPTYDERM

GEL HYDRO ALCOOLIQUE POUR LA DESINFECTION DES MAINS

Gel hydraté à base d'éthanol purifié associé à un agent d'étalement spécifiques.

Composition: ETHANOL, AQUA, GLYCERIN, FRAGRANCE, LINALOL, GERANIOL, CITRAL, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, CARBOMER.

Usage biocide entrant dans la catégorie TP 1 : Ethanol 70,2 % v/v

Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l'AFSSAPS (association française de sécurité sanitaire des produits de santé), B.P.F. selon les préconisations en cosmétiques (COSMED)

Formulation déposée aux Centres Antipoison sous le N° F2664

Eléments de composition autorisée par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets destinés à entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: GEL THIXOTROPIQUE
Masse volumique	: 893 G/L ± 20 G/L
Réaction chimique	: FAIBLEMENT ALCALIN
PH pur	: 8,3 ENVIRON
Odeur	: CITRON VERT
Couleur	: INCOLORE
Viscosité Brookfield à 20°C	: 1425 CPS MOBILE 5 VITESSE 100 TR/MIN 21°C



PROPRIETES PRINCIPALES

- **Prêt à l'emploi**, ne nécessitant pas d'eau, pas d'essuyage.
- Permet d'assurer le temps de contact indispensable pour une action de désinfection rapide, sans laisser de résidus.
- **BACTERICIDE** suivant normes suivantes :
 - ▶ NF EN 1276 (p.v. efficacité 02079/3) sur *Pseudomonas aeruginosa* CIP 103 467, *Escherichia coli* CIP 54 127, *Staphylococcus aureus* CIP 4.83, *Enterococcus hirae* CIP 5855(5 minutes).
 - ▶ NF EN 1276 (p.v. efficacité 06090 /1) sur *Salmonella typhimurium* CIP 58.58 (5 minutes)
 - ▶ NF EN 1276 (p.v. efficacité 06090 /4) sur *Listeria monocytogenes* CIP 54.149 (5 minutes)
- **FONGICIDE** :
 - ▶ EN 1650 (p.v. efficacité 06093 /2) sur *Candida albicans*, *Aspergillus niger* IP 1431.83 (15 minutes)
- **VIRUCIDE**
 - ▶ NF EN 14476 + A2 : conditions 30 sec : Actif sur Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR -1508, Actif sur Norovirus murin S9


L'utilisation du gel hydroalcoolique fait partie des mesures préventives pour l'hygiène des mains par le Ministère de la Santé, l'INPES, l'OMS, pour limiter la propagation des virus de la grippe, pour réduire les risques de transferts de contaminations, microbiennes manu-portées interhumaines notamment en période d'épidémies virales, gastroentérites (G.E.A. hivernales)

UTILISATIONS :

Services médicaux et professions de santé	Crèches, écoles	Maisons de retraite	Laboratoires d'analyses
Centres de soins ou de consultations	Ambulanciers	Pompiers et services de secours ou d'urgence	Secouristes
Soigneurs dans les élevages	Professionnels de la coiffure et des sports	Ateliers de fabrications, de conditionnements	Ateliers de préparation de denrées alimentaires, de plats cuisinés
Dentistes	Vétérinaires et cliniques vétérinaires	Magasins de ventes, hypermarchés	Laiteries, fromageries, boucheries, charcuteries

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- En application préventive avant de manipuler les objets, les matériels, surfaces, denrées alimentaires.
- En application curative, après chaque passage aux sanitaires ou après avoir touché des supports, objets contaminés ou présentant des risques de transfert manu-portés de micro-organismes.
- S'utilise sur des mains, surfaces préalablement propres et sèches.
- Prélever le volume d'une noix (soit 3ml) dans le creux d'une main.
- Bien étaler sur les mains en insistant par friction, entre les doigts, autour des ongles au niveau des poignets pendant 60 secondes.
- **Ne pas rincer ni essayer après application.**



RECOMMANDATIONS



H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P305+ P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+ P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Usage biocide TP 1 : Ethanol 70,2 % V/V

« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit ».

Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux. Maintenir hors de la portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme.

UFI : N310-5072-2009-S942

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota : Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.